


	入院当日～手術前日	手術当日	手術後1日	手術後2日	手術後3日	手術後7日	手術後8日～退院まで	
食事		手術後2～3時間後より水分が摂れます 手術後3～4時間後より食事が出来ます						
内服点滴	飲み薬を確認します	手術前から点滴をします 手術後必要に応じて輸血をします	抗生剤の点滴があります。(朝・夕)		抗生剤の点滴は飲み薬に変わります			
安静度		手術4時間後よりベッドを起こして座る事が可能です。	朝よりベッド上で足を伸ばして座れます	車椅子に乗れます				
リハビリ	手術前に膝の状態や歩行状態を確認します	手術後より装具で固定をします	足首, 足の指の運動を始めます 下肢の筋力訓練を始めます	車椅子に乗る動作を確認します 機器を使って膝の曲げ伸ばしを始めます	足の装具を外します 立つ練習や歩く練習を始めます 膝の曲げ伸ばしの練習や筋力訓練を行います			
血栓症予防		手術前～手術中弾性ストッキングを使用します 手術後より8時間フットポンプを使用します	歩けるようになるまで、ベッド上で足首や足の指をこまめに動かしましょう。 適度な水分をとりましょう。					
			6時から22時までフットポンプをします					

全人工膝関節置換術 ・ 片側型人工膝関節置換術

患者さん用 No.2

	入院当日～手術前日	手術当日	手術後1日	手術後2日	手術後3日	手術後7日	手術後8日～退院まで	
観察		手術後、体温、脈拍、血圧を時間毎に測ります ガーゼの汚れ具合を見ます	体温、脈拍、血圧を測定します	体温脈拍を測定します				
処置		創と腰へ管を入れます 床ずれ予防の為エアーマットを入れます	ガーゼが汚れていれば交換します 腰の管を抜きます	ガーゼ交換をします 創の管を抜きます エアーマットを抜きます			 手術後10日頃より2, 3日かけて創の糸を抜いていきます	
清潔			体を拭きます				創の糸が全部抜けて医師の許可があれば入浴できます	
排泄		手術室で尿の管を入れます		車椅子に乗れるようになったら尿の管を抜きます その後、車椅子でトイレに行けます				
検査		手術後、血液検査をします 手術室にてレントゲンを撮ります	医師の指示があれば血液検査をします			血液検査をします	手術後2週目と退院前に膝のレントゲン検査を行います	
その他	手術前オリエンテーションがあります	手術後に結果の説明があります 家族の方はできる限り病室にてお待ちください	*リハビリが中心になったら回復期リハビリテーション病棟に移っていただきます					